

薬剤師から患者さんへ

# ノルスパン®テープを使う時の注意

**使用を開始する前に、  
本説明書をお読みください。**



このテープは強い痛みを和らげるための貼り薬です。お薬の成分が、皮膚から血液中に入り効果を発揮します。効果は、7日間持続しますので、7日ごとに貼り替えてください。

## 使用するときの注意

- 次のような場合は医師または薬剤師に相談してください。
  - (1) 高度の発熱がある。
    - 体の中に吸収されるお薬の量が増える可能性があります。
  - (2) 妊娠している、または妊娠している可能性がある。
    - 胎児に影響を与える可能性があります。
  - (3) 母乳を与えている。
    - 母乳を通じて、赤ちゃんに影響を与える可能性があります。
  - (4) 他に服用しているお薬がある場合。(薬局で買ったお薬も含みます。)
- テープを貼っている部位を熱源(電気パッド、電気毛布、加温ウォーターベッド、赤外線灯、集中的な日光浴、サウナ、湯たんぽ等)に近づけないでください。
  - 体の中に吸収されるお薬の量が過剰になる可能性があります。
- 熱いお湯に長時間入浴することはお控えください。
  - テープを貼ったまま、シャワーを浴びる、入浴する、泳ぐことは可能ですが、熱いお湯に長時間入浴すると体の中に吸収されるお薬の量が過剰になる可能性がありますのでお控えください。
- 車の運転や危険な機械の操作を避けてください。
  - 予期しない出来事に、適切にあるいは迅速に対処できなくなる可能性があります。
- 飲酒をお控えください。
  - 副作用が出やすくなる可能性があります。
- MRI(核磁気共鳴画像法)による検査を実施する場合には、火傷を起こす可能性があるためテープをはがしてください。
- テープが他の人に誤って貼り付かないよう注意してください。
  - お子様と添い寝をした際などに誤って貼り付くと、お子様に影響が出る可能性があります。
  - テープの他者への付着に気づいた時は、すぐにテープをはがし、付着部位を水で洗い流し、異常が現れた場合には受診してください。



## 副作用に関する注意

- 吐き気が出たり、眠くなったりすることがあります。
- 便秘になることがあります。
- テープを貼っているところが赤くなったり、かゆくなったりすることがあります。
- 次のような症状が現れた時には、すぐにテープをはがし、担当の医師あるいは病院にご連絡ください。
  - 呼吸が、遅くなる、浅くなる、苦しくなる 等／
  - まぶたや顔、唇が腫れる 等／
  - 全身のかゆみや発疹 等
- その他、何かいつもと違うことに気づいた時は、担当の医師または薬剤師にご連絡ください。

## 保管・廃棄に関する注意

- 未使用のテープは包装袋を開けずに保管してください。
- 直射日光を避けて、30℃を超えない場所に保管してください。
- お子様やペットがさわれない場所に保管・廃棄してください。
- 使用済みのテープは、粘着面を内側にしてふたつ折りにたたんだ後、捨ててください。

## 使用方法についての注意

- 患者さん本人以外は絶対に使用しないでください。
- 他人や家族に譲ってはいけません。
- テープが他の人に誤って貼り付かないように注意してください。
- 7日ごとに貼り替えて使用してください。
- 必ず担当の医師または薬剤師の指示に従って使用してください。
- 担当の医師の指示なしに使用量(貼る枚数)を変更することは絶対にしないでください。
- このテープをハサミ等で切って使用しないでください。
- 傷口や湿疹等のあるところには貼らないでください。
- 何か異常が認められた場合には担当の医師または、薬剤師に相談してください。